


ÜBER
ERYSIPELATÖSE PNEUMONIE.



INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE


DER

HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT ZU GIESSEN

VORGELEGT VON

WILHELM SCHÖNFELD

AUS DARMSTADT.



DARMSTADT.

C. F. WINTER'SCHE BUCHDRUCKEREI.

1885.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

ÜBER

ERYSIPELATÖSE PNEUMONIE.



INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

DER

HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT ZU GIESSEN

VORGELEGT VON

WILHELM SCHÖNFELD

AUS DARMSTADT.



DARMSTADT.

C. F. WINTER'SCHE BUCHDRUCKEREI.

1885.

Alle Rechte vorbehalten.

*Koch*¹⁾ gelang es in einem Falle von tödtlich verlaufener Pneumonie, welche sich an einen überstandenen Recurrens angeschlossen hatte, in dem Alveolarexfudat, in den Lungen-capillaren und in den Capillaren der Niere Micrococcen nachzuweisen. Er hebt hervor, daß die Verbreitung der in diesem Falle gefundenen Bakterien an diejenige beim Erysipel erinnere, indem dieselben nur in den am Rande der verdichteten Lungenpartien gelegenen Alveolen zu finden waren. «Sollte sich nicht, — so schließt *Koch* diese kurze Mittheilung über diese Beobachtung, — noch manche Pneumonie, wenn die Randzone ganz besonders aufmerksam und mit Hülfe der auch in diesem Falle so bewährten Untersuchungsmethoden durchforscht würde, als eine durch Bakterieninvasion bedingte Krankheit herausstellen?»

Diese Vorstellung hat sich bekanntlich bald genug bestätigt; denn durch die neuesten Untersuchungen, besonders nach dem Vorgange von *Friedländer* ist festgestellt worden, daß die genuine fibrinöse (croupöse) Pneumonie auf der Invasion eines charakteristischen Microorganismus beruht, demnach eine typische Infectiouskrankheit ist, worauf thatsächlich schon seit längerer Zeit genaue klinische Beobachtungen, besonders durch *Jürgensen*, hindeuteten.

Schon *Klebs*²⁾, bezeichnete die Pneumonie mit Bestimmtheit als eine parasitäre Krankheit und beschrieb als

¹⁾ *Koch*, Mittheilungen aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt, herausg. von *Struck*, Berlin, 1881 pag. 46.

²⁾ *Klebs*, Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmacologie. Bd. 4 pag. 420.

«*Monas pulmonale*» einen Micrococcus, welcher im Bronchialinhalt und in der Hirnventrikelflüssigkeit bei Pneumonie sich vorfand.

Ferner beobachtete *Eberth*¹⁾ ellipsoide Coccen bei einer mit Meningitis complicirten Pneumonie; meist waren es zu zweien aneinander hängende Coccen, die er in dem Infiltrat der Lunge, in der entzündeten Pleura und in der Pia mater nachweisen konnte. Längere Ketten solcher Coccen und dichtere Anhäufungen derselben fehlten.

Es ist möglich, daß die von *Klebs* und *Eberth* gefundenen Coccen die specifischen Coccen der fibrinösen Pneumonie waren, — allein bewiesen ist es durchaus nicht.

Erst *Friedländer*²⁾ gelang es ganz charakteristische Coccen in jedem von ihm untersuchten Fall von fibrinöser Pneumonie nachzuweisen, dieselben auch in Reinculturen zu züchten und auf Thiere zu übertragen.

Nach *Friedländer* haben die Coccen ellipsoide Gestalt, hängen meist zu zweien zusammen (Diplococcen), bilden aber auch längere Ketten. In den Fibringerinnfeln der Bronchien sollen sie meist in flächenartiger Ausbreitung nebeneinander liegen. Im Alveolarinhalt grauroth hepatisirter Lungen fanden sich die betreffenden Coccen am reichlichsten, während dieselben an den grau oder graugelb hepatisirten Partien spärlicher nachgewiesen werden konnten. In einem Fall fanden sich die Coccen ganz außerordentlich reichlich in den Lymphbahnen des interstitiellen Bindegewebszuges, der an der Grenze des hepatisirten Bezirkes gegen das lufthaltige Lungengewebe verlief, während sie nie in der Alveolarwand, in der Wand der Bronchien und Gefäße gefunden wurden. Die mit Micrococcen erfüllten Lymphgefäße konnten mit bloßem Auge erkannt werden und stellten varicös-dilatirte Stränge dar.

¹⁾ *Eberth*, Deutsches Archiv für klinische Medizin. Bd. 28.

²⁾ *Friedländer*, Virchow's Archiv. Bd. 87 pag. 319.

Während jetzt nur noch über das Charakteristische der bei diesen Coccen manchmal nachzuweisenden kapselartigen Bildungen gestritten wird, dürfte nach diesen Untersuchungen *Friedländer's*, die von zahlreichen Autoren vollkommen bestätigt worden sind, an der infectiösen Natur der typischen fibrinösen Pneumonie nicht mehr gezweifelt werden.

Beruhn nun aber alle pathologisch-anatomisch mit bloßem Auge als fibrinöse Lobärpneumonie zu bezeichnenden Lungenentzündungen auf der Invasion jener von *Friedländer* gefundenen Diplococcen? oder veranlassen nicht auch andere Microorganismen ähnliche oder gar gleiche Lungenaffectionen?

A priori wird man sich wohl vorstellen können, daß ein Microorganismus, der eine allgemeine Blutinfection hervorruft, gelegentlich auch in der Lunge sich ausgedehnter localisiren kann und hier wenigstens ähnliche, mit bloßem Auge von der fibrinösen Lungenentzündung nicht zu unterscheidende Entzündungen wird erzeugen können.

Doch liegt es nicht in dem Rahmen vorliegender Arbeit, diese allgemeinen und weittragenden Fragen hier zu erörtern, vielmehr will ich mich darauf beschränken, eine Gruppe der Lungenentzündungen, die seit längerer Zeit schon mehr oder weniger abgegrenzt zu werden pflegten, genauer zu untersuchen, besonders in Bezug auf ihre ätiologischen, microparasitären Urfachen — ich meine die erysipelatösen Pneumonien.

Vom Erysipel wissen wir jetzt, daß demselben als ätiologische Basis ein sehr wohl charakterisirter Micrococcus zu Grunde liegt.

Daß das Erysipel eine überaus bösartige und hartnäckige Infectiouskrankheit ist, ist schon seit längerer Zeit bekannt und ist durch vielfältige Erfahrung bestätigt.

In Deutschland fand die Lehre von der Contagiosität des Erysipels, die in England längst zum Gemeingut aller geworden war, erst in den letzten Jahrzehnten Anklang.

*Wernher*¹⁾ und *Schönlein* waren die ersten, welche diese Ansicht acceptirten. In Frankreich, wo diese Anschauung ebenfalls lange um ihre Anerkennung zu kämpfen hatte, gebührt *Velpeau* und *Trousseau* das Verdienst, die Ursache des Erysipels nicht mehr in einer individuellen Disposition und constitutionellen Anomalie gesucht zu haben, sondern es gelang ihnen in fast allen Fällen, eine leichte Hautverletzung als Eingangspforte für das von außen kommende virus nachzuweisen. Das Zurückbleiben Deutschlands in Bezug auf die Lehre von der Contagiosität des Erysipels hängt damit zusammen, daß die *Galen'sche* Theorie von der biliösen Natur dieser Affection zu feste Wurzeln gefaßt hatte und man gar nicht an eine andere Möglichkeit dachte.

Direct ist die Contagiosität durch Impfversuche an Menschen bewiesen worden. *Doepp*²⁾ gibt folgenden Fall an: Von einem Kinde, das Tags darauf an Vaccineerysipel erkrankte, wurden neun andere Kinder geimpft und erkrankten sämmtlich an Erysipel. Ganz ähnliche Erfahrungen über Vaccinationserysipel machte *Barbieri*³⁾; einige der geimpften Kinder starben, fast alle erkrankten.

Ueber die Natur des Giftes stellte *Hueter*⁴⁾ die Hypothese auf, es handle sich um einen Microorganismus und glaubte er auch diesen in Form kleiner, stark beweglicher Coccen gefunden zu haben. *Lukomsky*⁵⁾ fand bei der Section von Leichen Erysipelkranker Micrococcen in den Blut- und Lymphgefäßen der Haut und des subcutanen Fettgewebes, sowie in den Capillaren der Niere und im Herzfleisch. *Tillmanns*⁶⁾, *Billroth*⁷⁾ u. a. haben ebenfalls

1) *Wernher*, Handbuch d. allg. und spec. Chir. Gießen 1862.

2) *Doepp*, *Schmidt's Jahrb.* 30 pag. 184.

3) *Barbieri*, *Virchow-Hirsch's Jahresbericht* 1857. IV pag. 120.

4) *Hueter*: 1) Berlin. Klin. Wochenschrift 1869 Nr. 33 Seite 357.

2) Grundriß der Chir. 1880.

5) *Lukomsky*, *Virchow's Archiv.* Bd. 60 pag. 418.

6) *Tillmanns*, Erysipelas, deutsche Chirurgie Liefg. 5 1880.

7) *Billroth* und *Ehrlich*, Untersuchungen über Coccobacteria septica. *Langenbeck's Archiv.* 20. Bd.

Bakterienbefunde bei Erysipel veröffentlicht. Eine genauere Beschreibung der Bakterien wurde dagegen von keinem der betreffenden Autoren gegeben, wohl darum nicht, weil damals die *Nägeli'sche* Theorie herrschte, nach welcher bekanntlich die verschiedenen Formen von Spaltpilzen nur Formen einer oder einiger weniger Species sein sollten, die im Laufe der Generationen sich ineinander verwandelten. Da man die Existenz specifischer Krankheitserreger leugnete, glaubte man, ein und derselbe Pilz könne, je nachdem er sich in den oberflächlichen oder tieferen Schichten der Haut localisire, bald Erysipel, bald Phlegmone, in andern Fällen gar Pyämie oder Septicämie erzeugen und hielt es natürlich nicht der Mühe werth, großes Gewicht auf die Beschreibung der Bakterienbefunde zu legen. Ferner hat auch *Koch* 8 Fälle von Erysipelas untersucht und in allen Fällen wurden in den Lymphgefäßen Coccen gefunden.

Ganz positive und beweisende Resultate in Bezug auf die specifische Natur eines Erysipelorganismus erbrachten erst die Untersuchungen von *Fehleisen*¹⁾. Er wies in 13 Fällen, von denen zwei lethal endeten, in den Lymphgefäßen der Haut, sowie des subcutanen Gewebes, besonders in denjenigen der oberflächlichen Schichten des Coriums übereinstimmend einen kettenförmigen Micrococcus nach. *Fehleisen* hat die gefundenen Microorganismen nie im Blute constatiren können. Dagegen war es *Lukomsky*, *Billroth* u. a. gelungen, in vielen Fällen von Erysipel ebenfalls im Blut Coccen zu finden. Die Vermuthung *Fehleisen's*, es handle sich um einen specifischen Spaltpilz, wurde durch seine Reinculturen und Impfversuche bestätigt. Im Laufe von zwei Monaten züchtete *Fehleisen* 14 Generationen. Durch ihre Art des Wachsthums, auf künstlichem Nährboden (man wählt am besten erstarrtes Blutserum) einen weißlichen Rasen zu bilden, unterscheiden sie sich von anderen kettenbildenden Microorganismen. Mit den durch derartige Rein-

¹⁾ *Fehleisen*, die Aetiologie d. Erysipels. Berlin 1883.

culturen erzielten Coccen stellte *Fehleisen* an Kaninchen und Menschen Impfversuche an und es gelang ihm wirkliches Erysipel zu erzeugen. Seine Impfversuche an Menschen beanspruchen zugleich therapeutisches Interesse, indem dadurch Gelegenheit gegeben war, über die bereits seit dem 17. Jahrhundert bekannte Heilwirkung der Rose bei inoperablen Neoplasmen Beobachtungen anzustellen.

Demnach existirt ein specifischer Micrococcus des Erysipels und es ist, wie schon *Friedreich*¹⁾ vermuthete, in hohem Grade wahrscheinlich, daß dieser Coccus unter Umständen sich auch an einer andern Stelle localisiren könnte, als wie gewöhnlich in der Haut. Er könnte in erster Linie sich von der Haut auf die Schleimhaut des Mundes, des Rachens u. s. w. in das Innere des Körpers continuirlich forterstrecken und hier gleiche krankmachende Erscheinungen hervorrufen. Auf demselben Wege könnte er schließlich auch in die Lunge gerathen und hier eine Entzündung bedingen, — selbstverständlich müßte aber angenommen werden, daß der Micrococcus hier in das Gewebe continuirlich fortwuchert, da an eine Einathmung wohl kaum zu denken ist. Auf der andern Seite könnte man sich vorstellen, wenn es sicher nachgewiesen wäre, daß derselbe specifische Organismus zu gleicher Zeit auch im Blut vorkäme, daß derselbe auf dem Blutwege in die Lunge und andere innere Theile gerathe und daselbst Entzündung hervorrufen könnte. Es ist also a priori eine solche Annahme, daß nämlich eine Lungenentzündung, die mit bloßem Auge betrachtet einer fibrinösen Pleuropneumonie nicht unähnlich ist, durch die Invasion eines andern als des *Friedländer'schen* Diplococcus z. B. durch den Erysipelcoccus ausgelöst werden könnte nicht unwahrscheinlich.

Bevor ich zur ausführlichen Mittheilung eines dieses beweisenden Falles übergehe, werde ich zunächst kurz die Angaben aus der Literatur zusammenstellen, die eine Ab-

¹⁾ *Friedreich*, Sammlung klinischer Vorträge, herausgeg. von *Volkman*. Nr. 75. 1874.

hängigkeit der Pneumonie vom Erythel, resp. nur ein zusammen Vorkommen beider beweisen.

Die Pneumonia erysipelatosia ist schon seit sehr langer Zeit bekannt und gehört zu den unter dem Sammelnamen «Erysipelas internum» beschriebenen Affectionen.

Die älteste schriftliche Aufzeichnung von Lungen-erythel finden wir bei *Hippokrates*¹⁾. Es ist selbstverständlich nicht zu entscheiden, welche seiner Beobachtungen als ächte Erythele zu bezeichnen sind, da *Hippokrates* einen Unterschied zwischen Erythel und Phlegmone ja keineswegs zu machen in der Lage war; er beschreibt jedoch einzelne Erythelepidemien so genau, daß wir jedenfalls annehmen können, er habe auch erysipelatosie Pneumonien gesehen.

*Galen*²⁾ kennt ebenfalls das Erysipelas internum. Seine Angaben darüber verdienen insofern ein größeres Vertrauen, als derselbe das Verdienst hat, das Erythel wenigstens von der Phlegmone getrennt zu haben, wenn ihm auch die Scheidung dieser Affection von verschiedenen anderen Hautkrankheiten noch nicht gelingen wollte.

Abgesehen von diesen dunklen Angaben bei *Hippokrates* und *Galen* haben zu unserer Kenntniß des Erysipelas internum fast nur die letzten 250 Jahre beigetragen.

So theilt 1570 *Baillou*³⁾ eine Epidemie zu Paris mit, in der eine bösartige Pneumonie mit Angina, Dysenterie und Typhus vorkam und die dabei beobachtete Pleuritis wird als eine erysipelatosie Affection bezeichnet.

Ferner beschreibt *Tosi*⁴⁾ eine im Jahre 1613 zu Gualda beobachtete Epidemie von erysipelatoser Pneumonie und

¹⁾ *Hippokrates*, edid. *Kühn*, Lipsiae 1827. 3. Bd. cf. Bd. I pag. 168 und 270 — Bd. II pag. 187.

²⁾ *Galen*i opera omnia, edid. *Kühn*, Lipsiae 1883. cf. Bd. V pag. 121, 223, Bd. XVIII pag. 268—270, Bd. XIX pag. 441.

³⁾ *Haefel*, Geschichte der epidem. Krankh. Bd. II Aufl. II. Jena 1865 pag. 345.

⁴⁾ *Haefel*, Lehrbuch der Geschichte der Medicin. Bd. II 1865 pag. 377.

*Sydenham*¹⁾ erwähnt Erysipele, die sich besonders mit Angina und Peripneumonie combinirten und hebt Beobachtungen hervor, in denen auf Erysipele Pneumonien gefolgt seien.

*Cullen*²⁾ dagegen leugnet ganz entschieden ein Erysipel innerer Theile resp. der Lungen und gibt nur eine Weiterwanderung in den Mund, Pharynx und Verdauungstractus zu, während wieder *J. P. Frank*³⁾ eine Uebertragung des Erysipels von der Haut durch Metastase und per contiguitatem auf innere Organe annimmt.

Auch *Rust*⁴⁾ ist der Ansicht, daß verschiedene durch Metastase entstehende Erysipele, auch solche der Lunge vorkommen können.

Eine größere Erfahrung über die Affection scheint *Stiebel*⁵⁾ zu haben. Er bezeichnet dieselbe ganz direct als Lungenrose und hält sie für eine seltene, schon den dritten oder fünften Tag tödtlich verlaufende Krankheit. Die Lungenrose komme selbständig vor, metastatisch nach andern Rosen und manchmal begleitet vom Typhus erysipelatosus. Einmal habe er das Auftreten der Gesichtsrose als rasche Krise gesehen. «Bei den Sectionen findet man den äußern Ueberzug der Lungen hell rosenfarben, manchmal mit kleinen Phlyctänen besetzt, wie bei pustulösem Erysipelas, oder wie beginnende kleine Darmgeschwüre bei Typhus abdominalis; die Bläschen unterscheiden sich deutlich von denen des Emphysems oder erweiterten Luftzellen. Die Luftzellen sind fast überall permeabel und knistern unter dem Messer, die Lungensubstanz sieht kohlen schwarz aus von überfülltem Blute fast wie brandige Milz, die Bronchien sind aber deutlich sichtbar.» — Man ersieht daraus, daß es sich nach der Schilderung *Stiebel's* nicht um eine wirkliche pneumonische Infiltration gehandelt hat.

¹⁾ *Sydenham*, opera medica, I pag. 174 und 159.

²⁾ *Cullen*, vergl. *Cornil*: Archiv général 1862 t. 19.

³⁾ *J. P. Frank*, Observat. medic. 1797 pag. 152.

⁴⁾ *Rust*, Handbuch d. Chirurgie. Bd. VI pag. 431.

⁵⁾ *Stiebel*, Wochenschrift für die gesammte Heilkunde, herausgegeben von *Casper* 1839. Nr. 1 pag. 9.

Im Jahre 1842, so berichtet *Sutton*¹⁾, herrschte in mehreren Provinzen der Vereinigten Staaten eine Epidemie einer Krankheit, welche sich verschieden äußerte. *Sutton* bezeichnete die Affection als «Erysipel der Lungen», weil die Erkrankung des Schlundes und der Respirationsorgane mit dem in vielen Fällen ausbrechenden Hauterysipel in der innigsten Beziehung stand. Die Epidemie zerfiel in 3 Hauptformen der Erkrankung: 1. Erysipelatöses Fieber mit Schlundaffection, Schwellung der Halsdrüsen ohne peripheres Erysipel; 2. Affection des Schlundes, häufig auf die Trachea, selten auf die Lungen sich ausbreitend, mit Rothlauf des Gesichtes und Kopfes; 3. erysipelatöse Affectionen innerer Theile, besonders der Lungen, des Darmes und der Harnorgane, in günstigen Fällen mit Ausbruch eines peripheren Erysipels.

Ähnliche Beobachtungen theilten *Poebles*, *Charles Hall* und *Detxer* mit.

*Lamaestre*²⁾ beschreibt ferner einen Fall, der eine gewisse Abhängigkeit des Erysipels von der Pneumonie beweisen soll. Ein junger, gesunder, blühend aussehender Mann hatte schon vor mehreren Jahren eine Pneumonie durchgemacht, zu der sich ein Gesichtserysipel gesellte. Dann erkrankte er wieder an einer Infiltration beider unteren Lungenlappen und gleichzeitig trat Erysipel des ganzen Gesichtes auf. Nachdem der Patient sich erholt hatte, die physikalischen Zeichen auf der Lunge geschwunden und das Exanthem abgeblaßt war, trat nach einigen Tagen abermals unter den Zeichen einer linksseitigen Lungeninfiltration das Erysipel des Gesichtes wieder auf.

Von den letzten fünfziger Jahren an beschäftigte man sich eingehender und genauer mit der Frage nach einem Erysipelas internum, besonders mit dem Erysipelas der Lunge und ganz vorzugsweise zeichneten sich eine Anzahl

¹⁾ *Haesler*, Lehrbuch d. Geschichte der Medicin. Bd. II Aufl. II. 1865 pag. 646. — Deutsche Chirurgie, Lieferung 5 pag. 41.

²⁾ *Schmidt's Jahrbücher*. 96. Bd. pag. 322.

französischer Gelehrter darin aus, so z. B. *Dechambre*, *Despres*, *Behier*, *J. Simon* u. a. m.

Auch dem Studium der Verbreitungswege auf die Lunge wandte man sich jetzt mehr zu.

So berichtet *Todd*¹⁾ von einem Fortkriechen des Erysipels von Schlund in die Luftröhre und Lungen. *Lailler*²⁾ beobachtete eine Fortsetzung des Erysipels vom Kopf auf die ary-epiglottischen Falten und ferner beschreiben Beobachtungen über Erysipel des Pharynx, des Larynx und der Lunge *Simon*³⁾, *Jungnickel*⁴⁾, *Hesse*⁵⁾ u. a. m.

Hervorheben möchte ich hier noch die Beobachtung von *Jacobs*⁶⁾, in welcher sich am 5. Tage zu einem Kopferysipel ein Pharynxerysipel und Endocarditis hinzugesellte und ganz besonders erwähnenswerth ist die Mittheilung von *Straus*⁷⁾.

Es handelte sich hier um einen 26jährigen Mann, der an Gesichtserysipel litt. Nachdem dasselbe im Erblaffen war, stellten sich Schluckbeschwerden ein, dann geringe Schmerzhaftigkeit der rechten Thoraxhälfte und etwas Husten. Hieran schloß sich nach einigen weiteren Tagen plötzlich starkes Fieber und rechts hinten unten eine ausgesprochene Dämpfung. Später traten noch Lungenerweichungen auf der linken Seite ein. Bei der Section fand sich eine lebhaft röthliche Pharynx-; der Larynx war frei; vom 4. Trachealring abwärts war die Schleimhaut auf die rechtsseitigen Bronchien übergehend intensiv geröthet. Die rechte Lunge unten im Stadium der grauen Hepatification mit rothen Flecken; auf dem Durchschnitt ergoß sich eine graue, schmierige Flüssigkeit. *Straus* erklärte sich den Proceß in folgender Weise: Das Hauterysipel ist

¹⁾ *Todd*, *Canstatt's Jahresbericht* 1855 IV pag. 243.

²⁾ *Lailler*, Thèse des Paris 1856.

³⁾ *Simon*, *Gaz. des hop.* 1867 pag. 536.

⁴⁾ *Jungnickel*, *Canstatt's Jahresbericht* 1855 pag. 243.

⁵⁾ *Hesse*, *Deutsche medicin. Wochenschrift* 1876.

⁶⁾ *Jacobs*, *Centralblatt für Chirurgie* 1875 pag. 347.

⁷⁾ *Straus*, *Revue mensuelle de med. et de chirurg.* 1879 Nr. 3.

auf den Rachen übergegangen, das letztere griff dann, den Larynx überspringend, auf die Trachea, die Bronchien und die Lungen über.

Diese kurzen Angaben über die älteren Beobachtungen von pneumonischen Affectionen beim oder im Gefolge von Erysipel mögen genügen, um kurz gezeigt zu haben, daß thatsächlich schon seit langer Zeit vom klinischen Standpunkt aus ein häufigeres Zusammentreffen von beiden Affectionen constatirt worden ist. Diese kurze Zusammenstellung mag um so mehr genügen, als mir nachträglich erst eine sehr lezenswerthe und verdienstvolle Arbeit von *Cremse*¹⁾ zu Gesicht kam, in der die historischen Daten über denselben Gegenstand in sehr ausführlicher und übersichtlicher Darstellung sich finden. Ich werde später noch die genau beobachteten, hierhergehörigen Fälle von *Cremse* mitzutheilen haben und gehe nun noch auf einige Beobachtungen der neueren Zeit kurz über.

In neuerer Zeit sind mehrfache Beobachtungen von sogenannter Wanderpneumonie oder Pneumonia migrans publicirt worden, Pneumonien, in denen die Infiltration von einem Ort zum andern wandert, nicht selten in sprunghaftem Fortschreiten, z. B. von einer Seite auf die andere, dann wieder allmählich und stetig umherschreitend, hier sich lösend, dort beginnend. Solche Beobachtungen haben unter anderen mitgetheilt: *Waldenburg*²⁾, *Fischl*³⁾, *Weigand*⁴⁾, *Homburger*⁵⁾ und in aller neuesten Zeit *Kueßner*⁶⁾.

Diese Formen der Pneumonie werden vielfach mit dem erysipelatösen Proceß in mehr oder weniger nahe Be-

1) *Cremse*, Ueber pneumonia erysipelatosa. Inaugural-Dissertation. Straßburg 1883.

2) *Waldenburg*, Berliner klinische Wochenschrift 1870 Nr. 41.

3) *Fischl*, Prager Vierteljahrschrift. Bd. 114 1872 pag. 112.

4) *Weigand*, Berliner klinische Wochenschrift 1870 Nr. 41. 1872 Nr. 1.

5) *Homburger*, Untersuchungen über croupöse Pneumonie. Inaugural-Dissertation, Straßburg 1873.

6) *Kueßner*, Deutsche medicinische Wochenschrift 1884 pag. 101.

ziehung gebracht und der entschiedenste Vertreter der Ansicht, daß die Pneumonia migrans als ein erysipelatöser Proceß zu betrachten sei, ist *Friedreich*¹⁾. Er sagt:

«Schon seit einer längeren Reihe von Jahren war ich auf diese eigenthümlichen wandernden Pneumonien aufmerksam geworden und fast in jedem Jahr bot sich mir Gelegenheit, derartige Fälle in meiner Klinik zu demonstrieren und auf die Besonderheiten derselben hinzuweisen.» «Wenn ich den eigenthümlichen serpiginösen Gang der in Rede stehenden Pneumonien, sowie deren ausgeprägte Neigung zur Doppelseitigkeit, durch welche Besonderheiten dieselben an die dem Erysipel eigenthümlichen Verhältnisse sich anschließen, in Zusammenhang bringe mit der von mir wiederholt gemachten Erfahrung eines mehrfachen Vorkommens derselben zu Zeiten, in denen acute Erysipela in größerer Zahl zur Aufnahme gelangten, so drängte sich mir immer der Gedanke in den Vordergrund, ob nicht jene wandernden Pneumonien als mit den Erysipelen in ätiologischer Beziehung verwandte, vielleicht selbst identische Processe aufzufassen seien, und ich glaubte von diesen Gesichtspunkten aus mit hinreichender Berechtigung schon seit Jahren in meinen klinischen Vorträgen jene Fälle geradezu als «erysipelatöse Pneumonien» bezeichnen zu dürfen.»

Friedreich hat bei diesen Fällen stets einen acuten Milztumor gefunden und nur aus individuellen Verschiedenheiten der localen Constitution der einzelnen Organe und aus einer hierhin begründeten größeren oder geringeren localen Erkrankungsdiathese lasse es sich einigermaßen begreifen, daß eine und dieselbe, durch den ganzen Körper verbreitete infectirende Substanz bald Erysipel des Gesichts, bald Pneumonie u. s. w. zur Entwicklung bringe.

Friedreich theilt eine solche Beobachtung kurz mit. Ein 61jähriger Knecht litt an einer in der rechten Seite beginnenden, von da nach hinten unten, und von hier

¹⁾ *Friedreich*, Sammlung klinischer Vorträge, herausgeg. von Volkmann Nr. 75 1874 pag. 12.

nach oben wandernden Pneumonie; als die Hepatification oben angekommen war, bestanden unten und in der Seite bereits die Erscheinungen der Lösung. Auf der Höhe der Erkrankung entwickelte sich eine linksseitige eitrige Pleuritis und eine diffuse eitrige Pericarditis, sowie eine erysipelatöse mit subcutaner Eiterung einhergehende Entzündung an der linken Hand und dem linken Vorderarm. In derselben Zeit waren mehrfache Fälle von Hauterysipelen zur Aufnahme gekommen.

Auch die Arbeit von *Schüller*¹⁾ läßt sich im Sinne *Friedreich's* verwerthen, indem nämlich derselbe unter 47 Fällen von Pneumonie 13mal nachweisen konnte, daß die betreffenden Individuen zugleich auch an Wundinfektionskrankheiten und darunter ganz besonders an Erysipel gelitten hatten.

Hierher gehören auch die drei Fälle von *Cremse*²⁾, die im Winter 1881/82 und Sommer 1882 in Straßburg beobachtet wurden und von denen zwei zur Section kamen. Ich werde dieselben im Auszug folgen lassen.

Fall I.

Klinische Diagnose: erst Erysipel des Gesichtes mit Pneumonie des linken Unterlappens, dann Wanderpneumonie mit nachträglichem zweiten Erysipel des Gesichtes.

Es handelte sich um einen kräftigen Arbeiter von 18 Jahren, der am 17. December an einem Gesichtserysipel mit abwechselndem Frost und Schweiß und starken Kopfschmerzen erkrankte; zugleich mit dem Erysipel traten heftige Schmerzen im Epigastrium und dem untern linken Rippenbogen entlang auf.

Cremse bringt auf Grund seiner Krankengeschichte den Verlauf der Affection in zwei Perioden.

1. Vom 17.—29. December ein rasch fortschreitendes Gesichtserysipel mit Pneumonie des linken Unterlappens.

1) *Schüller*, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 1877. Bd. 8 pag. 563.

2) *Cremse*, l. c. pag. 25.

Bei der Aufnahme hohes Fieber (40,2), dicroter Puls (100), Dyſpnoe (36), erheblicher Milztumor, viel Eiweiß im Urin. Mit dem Abblaffen des Eryſipels am 28. nahmen Fieber und Pulsfrequenz ab, der Milztumor ſchwand. Schließlich war Patient fieberfrei. Es folgte nun ein Stägliches Stadium der Reconvaſcenz und Patient verließ das Bett.

2. Vom 6.—18. Januar Pneumonie, die mit T. 41,0 und einer Pulsfrequenz von 120 einſetzte, zugleich beſtand eine eryſipelatöſe Röthe des Geſichtes, der am 9. Tage ein wirkliches zweites Eryſipel nachfolgte, ohne daß im Krankenſaal ſich ein ſolches befunden hätte. Das Eryſipel trat erſt auf, als die Pneumonie ſich zur Reſolution anſchickte, dauerte etwa 4 Tage, nachdem es an der linken Wange ſeinen Anfang genommen hatte. Was die Pneumonie anlangt, ſo war am dritten Tage im rechten Unterlappen eine pneumoniſche Infiltration nachzuweiſen, die ſpäter in vollſtändige Hepatiſation überging. Am 4. Tage Engouement im Mittel- und unteren Theil des Oberlappens. Vom 5. Tage ab beſtand auch geringe Infiltration des linken Oberlappens, welche nach zwei Tagen ſich wieder zu löſen begann.

In derſelben Reihenfolge wie die Infiltration geſchah auch die Reſolution der rechten Lunge, erſt im Unter-, dann im Mittel- und zuletzt im Oberlappen.

Die Pneumonie der zweiten Periode erinnert an die Pneumonia migrans, indem der Proceß von unten nach oben fortſchritt und während der Unterlappen ſich im Stadium der Reſolution beſand, im Oberlappen Hepatiſation zu conſtatiren war, bemerkenswerth iſt auch die Affection im linken Oberlappen.

Fall II.

Anatomische Diagnose. Acutes Eryſipel des Gaumens und Larynxeinganges, Bronchopneumonie mit zerſtreuten Heerden von Hepatiſation; fibrinöſe Pleuritis; chroniſcher Magenkatarrh; Milztumor.

Der Fall betrifft einen schwächlichen, marantischen Patienten von 64 Jahren; derselbe litt an häufigem Erbrechen, Brennen im Magen, so daß man an ein Carcinom dachte. An den Beinen deutliches, an den Händen nur geringes Oedem. Um dieselbe Zeit war gerade Erysipel im Spital endemisch. Am 15. Februar erkrankte Patient, nachdem er Morgens noch eine Temperatur von 37,6 mit 72 Pulsen gehabt hatte, am Abend mit einer Temperatur von 40,1 und Puls 104. Außer galligem Erbrechen und einer geringen Somnolenz konnte nichts gefunden werden. Nach zweitägigem Krankenlager erfolgte der Exitus.

Cremse meint, der Befund im Rachen sei als ein acutes Erysipel des Pharynx und Larynx zu deuten, da primäre Phlegmone dasselbst sehr selten sei und außerdem Erysipel im Spital damals vorhanden gewesen.

Fall III.

Anatomische Diagnose. Erysipel des Nackens, der Schulter und des Rachens, Pneumonie beider Unterlappen; Nephritis.

Patientin, eine kräftige Frau von 30 Jahren, bekam am 25. Juli ein Erysipel des Gesichtes; dasselbe hatte nicht mit Schüttelfrost, aber hohem Fieber, Taubheit, Delirien und starken Hals- und Kopfschmerzen begonnen. Am 29. war das Erysipel auf den Nacken fortgewandert, die Schleimhaut des Pharynx intensiv geröthet und geschwollen, auf Berührung Schmerz. Milz vergrößert. Albuminurie. Am folgenden Tag Erysipel der Schulter und Pneumonie des rechten Unterlappens. Am andern Tag Zunahme der Dämpfung, ferner auch links unten Dämpfung, viel Eiweiß und granulierte Cylinder. Am 1. August erfolgte der tödtliche Ausgang, nachdem das Erysipel bis zum Rücken gelangt war.

Zum Schlusse dieser kurzen Zusammenstellung der hierhergehörigen Literatur will ich nur noch die Mittheilung

von *Winkel*¹⁾ erwähnen, der angiebt, in einer größeren Reihe von erysipelatösen Erkrankungen bei Wöchnerinnen 6mal Pneumonie beobachtet zu haben.

Obwohl die von mir angeführte Literatur keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit machen will, so gestattet sie mir doch den Schluß, daß die Combination von Pneumonie mit Hauterysipel eine schon seit sehr langer Zeit beobachtete Thatfache ist und die beiden Affectionen meist in der Art auftreten, daß die eine der anderen folgt, und zwar entweder so, daß in einer gewissen Reihe von Fällen ein continuirlicher Zusammenhang beider Affectionen zu bestehen scheint, der dadurch bedingt ist, daß das Erysipel von der Haut sich auf den Rachen und Larynx verbreitete und so in die Lunge hinabstieg, oder die Fälle waren derart, daß ein allmähliches Weiterkriechen von Organ auf Organ ausgeschlossen werden mußte. In einer weiteren Beobachtungsreihe wurde das Auftreten eines Hauterysipels nach heftigen Pneumonien verzeichnet, und endlich wurden auch selbständige primäre Pneumonien, die sogenannten Wanderpneumonien als erysipelatöse Pneumonien beschrieben, mit und ohne Erysipel der Haut.

Obwohl man aus all diesen Thatfachen vermuthen konnte, daß manche Pneumonien ätiologisch und anatomisch mit dem erysipelatösen Proceß verwandt, ja manchmal sogar identisch sind, so war doch erst durch die Entdeckung *Fehleisens*, die ich in der Einleitung kurz besprochen habe und daher darauf verweise, die Möglichkeit gegeben, positive Beweise für eine derartige Annahme zu erbringen. Waren aber einmal die für das Erysipel charakteristischen und sich stets wiederfindenden Microorganismen, ein Kettencoccus, gefunden, so konnte es keine Schwierigkeiten mehr haben, den, wie gezeigt, schon seit langer Zeit vermutheten Zusammenhang beider Erkrankungen oder ihre Identität klar zu legen.

1) *Winkel*, Aertzliches Intelligenzblatt 1885 Nr. 10. *

Es ist nun im hiesigen pathologisch-anatomischen Institute gelungen, in einem Fall von Gesichtserypipel, an welches sich plötzlich eine Lungeninfiltration anschloß, in der Lunge die charakteristischen Coccen nachzuweisen.

Da ein derartiger positiver Nachweis, so viel mir bekannt, bis jetzt noch nicht erbracht worden ist, so sei es mir gestattet, die gemachte Beobachtung ausführlich mitzutheilen.

Der betreffende Fall kam Ende April vorigen Jahres auf der Gießener medicinischen Klinik zur Beobachtung, und theile ich, da man demselben einen gewissen Werth nicht wird absprechen können, an dieser Stelle die ausführliche Krankengeschichte mit.

Für die gütige Ueberlassung derselben sage ich Herrn Professor *Riegel* meinen besten Dank.

Anamnese:

C. S., Tagelöhner, 58 Jahre alt, ist früher stets gesund gewesen, hat nie Gelenkrheumatismus gehabt, auch nicht an kurzem Athem und andern Brustbeschwerden gelitten. Vor 4 Wochen stürzte Patient bei der Arbeit zusammen mit hochgradiger Schwäche und Ohnmachtsgefühl, jedoch ohne das Bewußtsein zu verlieren. Unmittelbar nach diesem Anfall konnte Patient nicht mehr sprechen und klagte über Schmerzen auf der linken Seite des Kopfes und in den linken Extremitäten. Etwa $\frac{1}{2}$ Stunde nach diesem Anfall konnte er wieder aufstehen und Arbeit verrichten, nur blieb die Sprache noch vollständig weg und kehrte erst allmählich im Laufe einiger Tage zurück. Seit jener Zeit bestehen Kurzathmigkeit und Husten, auch sind die Schmerzen der linken Seite nicht ganz gewichen. Vor etwa 14 Tagen bemerkte Patient Anschwellung der Beine und des Bauches. Obwohl die Beschwerden sich steigerten, konnte er noch bis zum 26. April Arbeit verrichten.

Status praesens (30. April):

Patient ist ein sehr kräftiger, muskulöser Mann, mit gutem Panniculus. Haut etwas schlaff, ohne Besonder-

heiten. Im Gesicht zeigt sich eine starke Röthung nebst zahlreichen Venenerweiterungen. Die Schleimhaut des Mundes und Rachens erscheint blaß, die Lippen zeigen geringe cyanotische Färbung. Die Pupillen reagiren etwas träge. Der Hals ist kurz und dick. Der Percussionschall auf beiden Lungen ergiebt sich als hell. In den Spitzen beobachtet man fast hauchendes Athmen mit zahlreichen, feuchten, besonders expiratorischen Geräuschen.

Der Thorax ist gut gewölbt und sehr kräftig gebaut. Die Athmung zeigt sich auf beiden Lungen als gleich, etwas beschleunigt und besonders das Expirium mit Anstrengung verbunden. Der Percussionschall ist rechts bis zur Rippe VII, links bis unter die Rippe V nachzuweisen. Die Athmung ist auf beiden Lungen sehr verlängert und mit zahlreichen, theils feuchten, theils trocknen bronchitischen Geräuschen verbunden.

Auf dem Rücken reicht der Percussionschall links bis zur Rippe XI, rechts bis zur Rippe IX. Das Athmungsgeräusch ist überall abgeschwächt, besonders rechts unten.

Am Herzen läßt sich der Spitzenstoß weder sehen noch fühlen. Die Dämpfungsgrenze reicht nach oben bis zur Rippe IV, nach rechts bis zur Mitte des Sternum, nach links bleibt dieselbe zwei Querfinger innerhalb der Papillarlinie und geht nach links unten bis handbreit oberhalb des Nabels.

Was die Herztöne anlangt, so hört man an der Spitze ein lautes systolisches Geräusch und einen reinen zweiten Ton, an der Pulmonalis ist leises, systolisches Geräusch bemerkbar, der zweite Ton erscheint rein. Für Aorta und Tricuspidalis gilt etwa daselbe. Im dritten linken Intercoostalraum macht sich das Geräusch ziemlich stark bemerklich und hört man den zweiten Herzton erheblich verstärkt.

Das Abdomen zeigt sich stark aufgetrieben, der Umfang beträgt über dem Nabel gemessen 98 cm, besonders stark tritt die Gegend des Epigastriums und der unteren seitlichen Partien hervor. Der Percussionschall zeigt sich

in der rechten Mammillarlinie bis 3 Querfinger unterhalb des rechten Rippenbogens, in der Mittellinie bis 4 Querfinger oberhalb des Nabels gedämpft. In der rechten Papillarlinie erreicht die Leberdämpfung den rechten Rippenbogen. In den abhängigen Partien erscheint der Schall gedämpft und hellt sich beim Lagewechsel auf.

Die Milzdämpfung scheint vergrößert zu sein. An den unteren Extremitäten bestehen starke Oedeme, die sich bis zur Inguinalgegend erstrecken. Scrotum und Penis zeigen sich stark geschwollen, ebenso ist die Haut des Rückens und Abdomens stark ödematös.

Die Menge des Urins zeigt sich verringert, die Farbe erscheint gelbgrünbraun, das Sediment ist als mäßigreichlich zu bezeichnen (der microscopische Befund folgt unten).

An der oberen Extremität scheint die grobe Kraft der rechten Hand gegen die linke nicht nur relativ, sondern auch absolut vermindert zu sein. Größere Störungen der Sensibilität bestehen nicht.

Der Appetit ist mäßig, der Stuhl etwas angehalten. Der Patient klagt besonders über starkes Spannungsgefühl des Leibes, ferner über linksseitigen Kopfschmerz und über Schmerzen in verschiedenen Muskelgruppen der linken Seite.

Ordo: Acidum, Liq. Ammon. anis.

V. 1. Die microscopische Harnuntersuchung ergibt in dem mäßig reichlichen, wolkigen Sediment eine nur geringe Anzahl, meist kurzer, dicker, hyaliner Cylinder, welche zum Theil mit exquisit deutlichen, charakteristischen Harnkanälchenepithelien bedeckt sind. Außerdem finden sich ganz vereinzelte Bruchstücke von granulirten Cylindern und eine außerordentlich große Anzahl rother Blutkörperchen, von theils ringförmiger, theils wohl erhaltener Gestalt. Die weißen Blutkörperchen sind nur sehr spärlich vertreten, ungefähr ein weißes auf zwanzig rothe.

V. 3. Trotz der Darreichung von Digitalis hat sich die Diurese kaum gehoben, eigentliche Oedeme bestehen nicht, nur fühlt sich die Haut etwas praller an.

V. 9. Bei dem Patienten hat *Digitalis* gar nicht gewirkt, gestern, ebenso wie in den letzten Tagen war er etwas somnolent. Vorgestern klagte Patient über sehr starke Kopfschmerzen, die ihn zu lautem Stöhnen, Aufschreien und Jactationen veranlaßten. Auf Anrufen scheint er ab und zu zur vollen Klarheit zurückgerufen zu werden. Ein Versuch mit *Coffein* hatte keinen Erfolg.

Ordo: Eisblase auf den Kopf. *Kaliacet.* mit *Acetum Scillae*.

V. 15. In den letzten Tagen war die Diurese wechselnd, die Klagen über Kopfschmerzen bestehen fort. Im Allgemeinen behauptet Patient, sich immer gut zu befinden. Die Geräusche am Herzen sind unverändert. Stärkere Oedeme bestehen nicht, der Appetit ist mangelhaft.

Ordo: *Vin. bulb. Scill.*; heißes Bad.

V. 16. Patient fing heute Morgen gegen 12 Uhr an irre zu reden, nachdem er schon seit längerer Zeit sich den Anordnungen widersetzt hatte und trotz des Verbotes das Bett verlassen wollte. Der Patient spricht sehr undeutlich und beantwortet die Fragen theils gar nicht, theils falsch, theils unter Wiederholung derselben Worte. Deutliche Lähmungen sind nicht vorhanden, doch scheint Patient seine Zunge schlechter zu bewegen. Patient ist manchmal unreinlich und befudelt sich. Die Eisblase auf dem Kopfe wird nicht geduldet.

V. 17. Patient wurde gestern Abend wieder klarer und gab vernünftige Antwort, manchmal in etwas aufgeregtem Zustand. Die Diurese ist sehr mangelhaft; das Gesicht ziemlich cyanotisch. Der Puls zeigt sich weniger kräftig als früher. Oedeme bestehen nicht, ebenso wenig Hydropien. Der Befund am Herzen und den Lungen ist derselbe wie früher.

V. 19. Heute befindet sich Patient entschieden besser, sein Bewußtsein ist ziemlich klar, nur Nachts zeigt er noch starke Unruhe und zum Theil auch Jactationen. Die Zunge wird nach rechts herausgestreckt, kann aber auch nach links bewegt werden. Der linke Mundwinkel hängt etwas

herab, das Pfeifen gelingt nur schlecht. Ein Theil des Harns wurde Nachts ins Bett gelassen.

V. 21. Gestern erhielt Patient zwei Striche Pilocarpin in 2^o Lösung, worauf jedoch kein Schweiß erfolgte. Das Allgemeinbefinden heute besser. Patient bekommt 3 Theilstriche Pilocarpin.

V. 22. Heute Morgen zeigte sich ganz unerwartet ein rasch über den größten Theil des Gesichtes symmetrisch sich verbreitendes Erysipel mit starker Schwellung, besonders der Lippen und der Augenlider. Die Temperatur betrug Morgens 39,2, Abends 38,2; der Puls Morgens 90, Abends 104. Patient ist manchmal vollkommen verwirrt und läßt deutliche Zeichen einer sich entwickelnden Psychose erkennen, namentlich ist er sehr unreinlich. Der Verband, den man über das Gesicht gelegt hatte, wird von dem Patienten weggerissen.

V. 24. Patient zeigte sich gestern etwas ruhiger, ist dagegen in der Nacht immer sehr ungebärdig. Das Erysipel beginnt abzublassen. Temperatur Morgens 38,2, Abends 39,8; Puls 118 und 120.

V. 26. Das Erysipel ist etwas abgeblaßt, aber das rechte Auge immer noch stark geschwollen. Im Uebrigen ist das Befinden des Patienten unverändert. Temperatur Morgens wie Abends 37,0; Puls 84 und 96. Patient ist in der letzten Zeit stark abgemagert und zeigt völlige Theilnahmllosigkeit, manchmal antwortete er auf Fragen, die nicht an ihn gerichtet sind. Der Puls ist gut gespannt.

V. 28. Patient hatte heute früh einen ziemlich heftigen Schüttelfrost mit vermehrter Respirationsfrequenz. Am Morgen zeigte sich der Percussionschall rechts hinten, unten abgeschwächt, das Athmen erscheint unbestimmt und man hört mäßig reichliches, feines Knistern. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur von 38,8 auf 40,2. Der Puls zeigt 120 Schläge Morgens wie Abends und ist stark dicrot. Respiration über 40. Das Gesicht erscheint stark fieberhaft geröthet, Athmung und Percussions-

schall ist vorn normal, dagegen bemerkt man rechts hinten unten von der Mitte der Scapula an eine ziemlich starke tympanitische Dämpfung und darüber spärliches Knistern. Die Inspiration ist fast aufgehoben, das Expirium scharf laufend. Links hinten unten gleichfalls eine etwa handbreite Dämpfung. Weiter nach links wird der Schall wieder tympanitisch. Das Athmen erscheint über der Dämpfung scharf bronchial, Rasseln läßt sich zur Zeit nicht nachweisen. Patient ist völlig ohne Besinnung und nimmt nichts zu sich. Am Herzen sind die einzelnen Töne wegen der beschleunigten Respiration nicht unterscheidbar. Ordo: Eisblase, Injectionen von Kampher.

V. 29. Morgens 6 Uhr stirbt der Patient.

Recapitulire ich in Kürze das eben geschilderte Symptomenbild, so war es im Wesentlichen folgendes:

Ein kräftig gebauter Mann, der seit einiger Zeit schon an bestimmten Beschwerden von Seiten des Herzens und der Nieren mit ihren Folgen litt, sucht nach einem apoplektiformen Insult Hülfe auf der Klinik. Während seines Aufenthaltes im Hospital tritt ganz plötzlich ein Gesichtserysipel auf, das sich symmetrisch auf beiden Seiten des Gesichts ausbreitet. Am 4. Tage ist dasselbe größtentheils abgeblaßt und am 6. Tage (von dem Tage der Eruption gerechnet) bildet sich, obwohl vorher von Seiten der Respirationsorgane keine Störungen oder Klagen bestanden hatten, durch einen heftigen Schüttelfrost eingeleitet, eine hauptsächlich rechtsseitige Infiltration der Lunge aus, die am 7. Tage nach dem Auftreten des Erysipels tödtet.

Wir sehen also auch hier, wie es mehrfach, ja wie mir scheinen will, meistens beobachtet worden ist, erst ein cutanes Erysipel auftreten und sich, nachdem dasselbe erblaßt ist, daran eine Lungenentzündung anschließen.

Ich bemerke hierzu, daß zu der Zeit auf der Krankenabtheilung ein häufigeres Auftreten von Erysipel nicht beobachtet wurde. Daß dagegen der Patient das cutane pri-

märe Erysipel in dem Krankenhause acquirirt hat, wird wohl nicht bestritten werden können.

Die Section (Professur *Boltroem*), 30 Stunden post mortem gemacht, ergab folgendes:

Leichendiagnose:

Chronische Endocarditis der Tricuspidalis, Mitralis und Aorta;

Hypertrophie des Herzens;

chronische interstitielle, hämorrhagische Nephritis;

Lungenemphysem;

Bronchitis;

rechtsseitige Pleuropneumonie;

ausgedehnte Lymphgefäßectasien der Pleura und in der Substanz des rechten Unterlappens;

Milzschwellung;

Fibrom der Niere;

schwarze Pigmentirung der Dünndarmschleimhaut;

linksseitiger Hydrothorax mit partieller Compression des Unterlappens;

Hydropericard;

Ascites;

Anasarca.

Männliche Leiche, mittelgroß, schlecht genährt. Die Haut von etwas düsterem Colorit, sehr schlaff, mit ausgedehnten blassen Todtenflecken, an den Lippen und Ohren cyanotisch gefärbt. Beide Pupillen gleich, von mittlerer Weite. An den Unterschenkeln und Knöcheln ödematöse Schwellung. Starke Starre. Unterhautzellgewebe ziemlich fettarm. Die Musculatur mäßig entwickelt, dunkelbraunroth, trocken und mit schlaffer Fafer. Der Bauch ziemlich aufgetrieben; die Decken gespannt. In der Unterleibshöhle findet sich eine reichliche Menge (circa 3 Liter) einer klaren, gelben Flüssigkeit.

Das Zwerchfell steht rechts und links am unteren Rand der IV. Rippe. Nach Abnahme des Sternums finden sich die Lungen sehr stark ausgedehnt, collabiren gar nicht.

Linke Lunge an der Spitze und hinten strangförmig adhärent, ebenso die rechte Lunge. In der linken Pleurahöhle etwa 200 gr klare Flüssigkeit, in der rechten circa 150 gr einer trüben citrig-serösen Flüssigkeit, der kleine, weiche fibröse Gerinnsel beigemischt sind.

Im Herzbeutel reichliche ganz klare Flüssigkeit. Beide Vorhöfe sehr stark mit äußerst zähen Fibringerinnseln und wenig flüssigem Blut gefüllt. Der linke Ventrikel, ziemlich eng contrahirt, enthält nur wenig festgeronnene Fibringerinnsel, der rechte mäßig weit mit wenig Fibringerinnseln und locker geronnenen Cruormassen gefüllt. Das Herz dicker, besonders am linken Ventrikel, außen mit spärlichem fulzig atrophischem Fettgewebe. Ueber dem rechten Ventrikel ein scharf umschriebener, zottiger Sehnenfleck. Musculatur des rechten Ventrikels 4—4½ mm dick, ziemlich blaßbraun, fleis. Die Pulmonalis ist dilatirt und mißt über der Klappe aufgeschnitten 9 cm, ist äußerst dünnwandig und innen vollkommen glatt. Die Klappen der Pulmonalarterie sind groß, sehr zart, etwas gefenstert. Das Tricuspidalostrium ist gerade für 3 Querfinger durchgängig, mißt aufgeschnitten 13½ cm. Die vordere Klappe ist 2,8 cm hoch, der untere Rand in der Höhe von 1,2 cm sehr stark verdickt, bis ungefähr 7 mm dick; theils ist sie in dieser Gegend derb sehnig, theils grauweißopak, mit kleinen gelblichen Kalkplatten, zum größeren Theil jedoch ist die innere verdickte Membran durchbrochen, uneben zottig und grob granulirt, einem atheromatösen Geschwür ähnlich; die obere Partie der Klappe vollkommen zart und durchscheinend. Die zur Klappe gehörenden Sehnenfäden nur ganz leicht verdickt. Die laterale Klappe bis 2,3 cm hoch, die Basis dieser Klappe nur wenig getrübt, dagegen die unteren Ränder derselben in der Ausdehnung von 1 cm sehr stark verdickt, während dazwischen eine etwa 1½ cm

breite Partie weniger verdickt ist. Von diesen beiden verdickten Stellen an den Enden der Klappe ist die lateralwärtsgelegene bis 7 mm dick, sehr fest, grauweiß und gelblich, opak sclerofirt, an der Spitze mit grauweißopaken und graurothen, grobkörnigen Granulationen, — die medianwärtsgelegene Verdickung ist dagegen höher, mehr stalaktitenförmig, die Basis hat einen Durchmesser von 8 mm und die ganze verdickte Stelle eine Höhe von $1\frac{1}{2}$ cm, sich kegelförmig zuspitzend, die Basis wieder stark sclerofirt, die vor springende Spitze trocken, grauweiß, opak, körnig. Die Sehnenfäden dieser Klappe etwas verdickt und verkürzt. Die mittlere Klappe hat eine Höhe von 2 cm, ist gleichmäßig, aber nicht stark verdickt, mit gelblichen, opakgrauweißen Einlagerungen und am Schließungsrande mit einigen knopfförmigen, kammartig vor springenden, derben, graurothen endocarditischen Wucherungen besetzt. Die Sehnenfäden dieser Klappe sind zart.

Die Musculatur des linken Ventrikels sehr kräftig entwickelt, bis 1,5 cm dick, von dunkelbräunlicher Farbe. Mitralostium bequem für zwei Querfinger durchgängig, beide Klappen an den Rändern sehr stark verdickt. Am Aortenzipfel der Mitralis findet sich am untersten Theil des Schließungsrandes eine 1 cm lange, derbe, grauweiße und grauröthliche, an der Spitze mit kleinen Granulationen besetzte Wucherung, die auf einer breiteren, sclerofirten Basis aufsitzt, gleiche, aber ganz flache Vegetationen am hinteren Zipfel. Foramen ovale für eine grobe Sonde durchgängig.

Die Aortenklappen schlußfähig. Aorta dilatirt, über den Klappen aufgeschnitten 9 cm weit. Die Innenfläche diffus verdickt mit spärlichen, fettigen Flecken. Die Klappen groß, diffus verdickt, an den Nodulis mit leicht gekörnten, grauweißopaken, nur wenig durchscheinenden Wucherungen.

Linke Lunge. Der Oberlappen sehr stark emphysematös gedunsen, besonders an den vorderen Rändern, theils stark durchscheinend, theils in Form großer Blasen

vorgetrieben; der Oberlappen größtentheils lufthaltig, ziemlich blutarm, nach hinten oben etwas ödematös. An der Spitze und nach hinten einige kleine schwarze Narben mit kreidigem Centrum, an welche das Lungengewebe etwas strahlig herangezogen ist. Der Unterlappen im oberen Drittel lufthaltig, ziemlich blutarm, wenig ödematös und die vorderen Ränder stark emphysematös gedunsen. Die zwei unteren Dritttheile luftleer comprimirt und ziemlich blutarm, äußerst zähe. In den Bronchien reichlich zäher Schleim. Die Schleimhaut der Bronchien stark dunkelbläulichroth injicirt.

Rechte Lunge. Der obere und der nicht deutlich und scharf abgegrenzte Mittellappen stark emphysematös gedunsen, die vorderen Ränder stark durchscheinend, ziemlich blutreich und nach hinten oben etwas ödematös. Der Unterlappen stark vergrößert, sehr schwer, außen in ganzer Ausdehnung mit leicht abziehbaren, äußerst zähen Fibrinschichten bedeckt, auch an der ziemlich fest infiltrirten Basis die Pleura pulmonalis mit meist zarten, an der Oberfläche fein körnigen und fein gerippten fibrinösen Massen versehen. An der Basis des Unterlappens ganz besonders, dann aber auch an den vorderen und hinteren Partien des Lappens finden sich an der Pleura sehr ausgedehnte, scharf landkartenartige, theilweise hervorragende Zeichnungen, die theils von sehnig weißer Farbe, theils leicht grauweiß durchscheinend sind. Dieselben stellen vielfach untereinander communicirende Stränge dar, oft ganz engmaschig und dann meist nur ein oder wenige Lungenläppchen umfassend, oft weitmaschig, sich an längere Stränge anschließend. Die Weite derselben ist verschieden, theils zeigen sie nur kleine Ausbuchtungen, theils sind sie ganz exquisit rosenkranzförmig angeschwollen. Dem ganzen Verlauf nach handelt es sich um gefüllte und dilatirte Lymphgefäße. Beim Einschneiden auf solche Stränge und leichtem Drücken auf dieselben entleert sich eine sehr zähflüssige grauweiße Masse. Nur der unterste, vorderste Rand noch

lufthaltig, blutreich und ödematös, das übrige Gewebe luft-leer, hepatisirt. Die Substanz auf dem Durchschnitt blut-arm, größtentheils grau, nur stellenweise grauröthlich, ziemlich stark brüchig. Die Schnittfläche zum allergrößten Theil glatt, nur nach oben an einzelnen Stellen feinkörnig, besonders aber an den grauröthlichen Stellen. Von der Schnittfläche ergießt sich eine sehr reichliche Menge einer trüben, grauen und graubräunlichen, äußerst klebrigen Flüssigkeit. In den Bronchien finden sich nur geringe Mengen etwas zähen, grauen Schleimes, keine Gerinnfel, die Schleimhaut der Bronchien blaß. Auffallend sind ferner auf allen Durchschnitten, theils schmälere, theils bis 5 mm breite ungleichmäßig ausgebuchtete, meist starrwandige Kanäle, aus denen sich sehr reichliche zäh-schleimige, grau-weiße Massen ergießen. Dieselben finden sich überall in der Mitte des Gewebes — sie sind aber besonders deutlich um die mittelgroßen Bronchien angeordnet und stellen überhaupt theils rundliche oder ovale Querschnitte, theils weit-maschige communicirende Hohlräume dar.

An der Zunge finden sich keine Abnormitäten.

Schlund und Rachen-schleimhaut blaß, ebenso die Speiseröhre.

Kehlkopf und Luftröhre enthalten etwas schleimige Flüssigkeit, die Schleimhaut des Kehlkopfes blaß, die der Trachea an der hinteren Wand nach unten zunehmend etwas geröthet.

Die Drüsen der Trachea und der Bronchien nicht geschwellt, grau- und schwarzfleckig.

Milz 15 cm lang, $9\frac{1}{2}$ cm breit, 5 cm dick, außen glatt, Substanz auf Durchschnitten dunkelbraunroth, ziemlich derb, mit nicht sehr reichlicher, breiiger Pulpa.

Nieren. Linke Nierenvene sehr stark mit geronnenem Blut gefüllt, Arterie normal weit, mäßig gefüllt. Die linke Niere 13 cm lang, 5 cm breit, 4 cm dick. Die sehr dünne Kapsel etwas fester haftend, doch ziemlich glatt lösbar. Die Substanz auf Durchschnitten blutreich, Corticalis etwas

breiter, auf blaßgrau und grauröthlichem Grunde mit dunkelbraunrothen verwaschenen und grauschwärzlichen Punkten und Streifen durchsetzt, dazwischen kleine, ziemlich stark gefüllte Gefäßreifer. Die Glomeruli als kleine graue, vorspringende Knötchen erkennbar. Pyramiden ziemlich dunkelbraunroth gefärbt, in einer ein erbsengroßes Fibrom, in den anderen Papillen Kalkinfärcete. Nierenbecken normal weit, Schleimhaut blaß.

Rechte Niere durchaus ebenso.

Die Ureteren normal.

Die Harnblase eng, nur wenig trüben, grauen Urin enthaltend. Die Schleimhaut wenig injicirt.

Die Nebennieren normal.

Die Pfortader ziemlich stark gefüllt mit locker geronnenem und flüssigem Blut.

Die Leber in beiden Lappen größer, außen vollkommen glatt. Die Substanz ziemlich blutreich, blaßgelblichbraun und dunkelröthlich marmorirt, dazwischen eine Anzahl kleiner, grauer Pünktchen sichtbar. Die Portaldrüsen schwarz pigmentirt. Gallenblase mit etwas dünnflüssiger, gelblicher Galle gefüllt. Die übrigen Gallengänge normal.

Magen mäßig weit, enthält etwas flüssige, graue Speisereste. Die Magenschleimhaut fleckig injicirt, etwas marmellonirt.

Innenfläche der Aorta thoracia und abdominalis nur mit geringen, sclerosirten Platten besetzt, an der Einmündung des Ductus thoracicus eine größere Kalkplatte.

Dünndarm ziemlich weit, enthält reichlich dünnflüssige Chymusmassen. Die Schleimhaut im untersten Theil blaß, nach oben stark fleckig pigmentirt, mit dichter, schwarzer Zottenpigmentirung. Dazwischen einige Chylusextravasate.

Mesenterium mäßig fettreich, die Mesenterialdrüsen klein, grauroth, locker.

Der Dickdarm enthält dünnflüssige Fäcalmassen. Die Schleimhaut blaß und ebenfalls fleckig pigmentirt.

Das soeben mitgetheilte Sectionsprotokoll zeigt uns außer den Veränderungen an der Lunge auch einen interessanten Herzbefund, insofern nämlich die Verdickungen und endocarditischen Wucherungen der Tricuspidalis so hochgradig und ausgedehnt sind, wie man sie sonst nur selten zu beobachten Gelegenheit haben wird. Eine weitere Besprechung dieser Veränderungen an der Tricuspidalis würde jedoch zu weit von meinem Thema mich abführen und begnüge ich mich daher mit diesem kurzen Hinweis.

Obleich die Section in Uebereinstimmung mit der klinischen Diagnose eine Pneumonie des rechten Unterlappens ergeben hat, und zwar mußte eine fibrinöse Pneumonie angenommen werden, so war es doch auffallend, daß die pneumonische Infiltration, die, wenn man aus dem Schüttelfrost einen Rückschluß auf den Eintritt der Pneumonie machen will, kaum länger wie 24 Stunden bestanden haben konnte, größtentheils grau gefärbt, nicht granulirt war und in entschiedener Lösung begriffen zu sein schien, da sich von der Schnittfläche eine sehr reichliche Menge einer grauen, trüben, klebrigen Flüssigkeit ergoß — ein Befund, wie er nur erklärlich war, wenn man annahm, die Pneumonie sei nicht etwa 24 Stunden, sondern bereits 6—8 Tage alt.

Auffallend waren ferner die eigenthümlichen Zeichnungen an der Oberfläche der Pleura des pneumonisch infiltrirten, rechten Unterlappens, die auf eine Affection der oberflächlichen Lymphgefäße, als auch der des Lungeninnern schließen ließen. Da nun eine vorläufige frische Untersuchung des Lymphgefäßinhaltes etwas Auffallendes nicht ergab, und von dem erysipelatösen Proceß der Haut noch keine Mittheilung bei der Section gemacht war, so wurden neben Theilen anderer Organe auch die Lungen conservirt.

Nach sorgfältiger Härtung der Lunge in Alkohol wurden Theile derselben, an denen deutlich jene dilatirten Lymphgefäße zu sehen waren, in Celloidin gebracht, mit

dem Microtom in feine Schnitte zerlegt und gefärbt untersucht, wobei sich schon bei Betrachtung der ersten Schnitte ergab, daß es sich um eine fibrinöse Pneumonie, wie sie nach dem microscopischen Befund angenommen werden mußte, nicht handeln konnte, sondern vielmehr die Charaktere einer catarrhalischen Pneumonie vorlagen.

Die Alveolen waren nämlich durchaus nicht mit fibrinösen Massen erfüllt, sondern enthielten fast ausschließlich Rundzellen, obgleich hie und da auch einige wenige Fibrinfäden in einzelnen Alveolen beobachtet wurden. Auffallend war ferner die durchaus nicht sehr dichte Ausfüllung der Alveolen mit Rundzellen, was man doch bei dem derben und festen Charakter des Infiltrates erwarten konnte.

Die Festigkeit des Infiltrates scheint vielmehr durch die oft enorme Dilatation und pralle Ausfüllung äußerst zahlreicher Lymphgefäße der Lunge bedingt worden zu sein.

Auf Durchschnitten finden sich, wie das nach dem macroscopischen Aussehen schon zu erwarten war, nicht nur die pleuralen Lymphgefäße, sondern auch die größeren Stämme des interstitiellen Gewebes, die Lymphräume um die Bronchien verschiedenster Ordnung, um die Gefäße u. s. w. dilatirt und mit etwas verschiedenem Material in folgender Weise gefüllt:

Die eine Gruppe von Lymphgefäßen beherbergt fast ausschließlich oder vorzugsweise Lymphe, die in Form feiner Körnchen oder längeren Fäden geronnen und der nur spärliche Lymphkörperchen beigemischt sind, bei einer andern besteht der Inhalt hauptsächlich aus lymphoiden Zellen, mit zum Theil nicht unbedeutender Quellung und Vergrößerung. Zwischen diesen beiden Ausfüllungsarten finden sich die verschiedensten Uebergangsformen, so daß in einem Lymphgefäße mehr geronnene, im andern mehr corpusculäre Lymphe vorhanden ist. In einer dritten Reihe von Lymphgefäßen beobachtet man neben einer centralen Zone von geronnener Lymphe und lymphoiden Elementen

eine ganz exquisite Wucherung der Endothelzellen an der Peripherie, so daß die Innenwand jener Lymphgefäße mit einer mehrfachen Schicht epithelähnlicher, polygonaler Zellen ausgekleidet ist. Dieser letztere Befund konnte besonders an den Lymphgefäßen der größeren interstitiellen Bindegewebssepta constatirt werden, während die beiden zuerst hervorgehobenen vorzugsweise in der Umgebung der Bronchien vorkamen.

Da der klinischen Beobachtung nach die Infiltration der Lunge kaum 24 Stunden bestanden haben sollte, so war die vorliegende Pneumonie möglicherweise doch noch eine fibrinöse, von freilich etwas eigenthümlichem Anfangscharakter und besonderer Betheiligung der Lymphgefäße, und der Nachweis der von *Friedländer* gefundenen Pneumonicococcen würde in diesem Falle die gewünschte Klarheit gebracht haben. Zu diesem Zwecke wurde nun eine Anzahl Schnitte aus den verschiedensten Gegenden der Lunge nach der *Gramm'schen* und anderen Methoden gefärbt, nirgends konnten jedoch die für die fibrinöse Pneumonie charakteristischen Coccen gefunden werden.

Dagegen gelang es nun sofort in dem ersten Schnitt Coccenketten in einem dilatirten Lymphgefäße zu constatiren, die eine so große Ähnlichkeit mit den Coccen des Erysipels zeigten, daß erst daraufhin genauere Erkundigungen über den Krankheitsverlauf eingezogen wurden, wobei sich herausstellte, daß der Patient vor der Pneumonie ein Gesichtserysipel gehabt hatte; damit war natürlich Veranlassung gegeben, den gemachten Coccenbefund in der Lunge einer ausgedehnteren Untersuchung zu unterwerfen.

Zu diesem Zwecke wurden von äußerst zahlreichen Stellen der Lunge mit dem Microtom Schnitte von $\frac{1}{100}$ mm Dicke angefertigt und dieselben dann mit der stark kalihaltigen Methylenblaulösung nach *Löffler*¹⁾ gefärbt, da sich

¹⁾ *Löffler*, Mittheilungen aus dem kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. II pag. 439.

ergeben hatte, daß sich die Coccen nach dieser Färbungsmethode am deutlichsten und klarsten tingirten.

Da in allen untersuchten Schnitten der Befund ein vollkommen gleicher war, so kann ich mich in dieser Beziehung kurz fassen.

Die Micrococcen zeigten überall, wo das einzelne Korn sich deutlich abgrenzen ließ, eine durchgehend gleichmäßige Größe. Von Diplococcen war an keiner Stelle etwas zu bemerken. Was die Anordnung der Coccen anlangt, so ist zu bemerken, daß dieselben fast ausnahmslos leicht bogenförmig oder auch S-förmig oder auch doppel-S-förmig gestaltete Ketten bilden. Oft waren die Ketten der Coccen sehr lang und hie und da beobachtete man auch verzweigte Ketten, die durch Aneinanderlagerung mehrerer Ketten entstanden waren.

Als Aufenthaltsort dieser Ketten, die genau wie die Ketten des Erysipelcoccus ausfahen, konnte man fast ausschließlich die dilatirten Lymphgefäße bezeichnen. Hier sah man dieselben manchmal in Form isolirter einzelner Coccen, dann wieder als bogenförmige Ketten entweder einzeln oder in großen Haufen angeordnet, aber nie so dicht, daß man das einzelne Korn nicht hätte deutlich unterscheiden können. Niemals wurden die Coccen in den Zellen des Lymphgefäßinhaltes beobachtet, oft dagegen umgab eine bogenförmige Kette von Coccen ziemlich eng eine Zelle.

In den dilatirten Lymphgefäßen mit Wucherung der Endothelzellen erblickte man eine nur spärliche Anzahl von Coccen — einzeln und in Kettenform; dagegen waren sie in Lymphgefäßen mit gemischtem, aus geronnener Lymphe und Zellen bestehenden Inhalt schon reichlicher, ganz besonders häufig und in großen Gruppen fanden sich jedoch die Micrococcen in den mit feinkörnig oder fädig geronnener Lymphe gefüllten Lymphgefäßen.

Genau dieselben Coccen beobachtete man auch in der Pleurahöhle, indem man nämlich bei denjenigen Präpa-

raten, die von der Oberfläche der Lunge stammten und also einen Pleuraüberzug trugen, in den darauf abgelagerten theilweise noch vorhandenen Massen fibrinösen Exsudates, an einzelnen Stellen äußerst zahlreiche Coccen von gleicher Größe und Gruppierung wie in den Lymphgefäßen der Lunge constatiren konnte.

In dem entzündlichen Alveoleninhalt jedoch waren trotz des sorgfältigsten Nachsuchens in keinem einzigen Schnitte Micrococcen zu erblicken und bestand der Inhalt der Alveolen, wie bereits oben angegeben, ausschließlich aus Rundzellen, nur hier und da mit einigen Fibrinfäden vermischt.

In einzelnen Blutgefäßen der Lunge fanden sich die Micrococcen ebenfalls; so waren hin und wieder einige kleine Capillaren auf das Dichteste mit Micrococcen angefüllt, an denen jedoch das einzelne Korn derselben und ihre Gruppierung nicht eruirt werden konnte; andererseits bemerkte man aber auch in größeren Blutgefäßen, deren Inhalt noch vollkommen vorhanden war, zwischen den rothen Blutkörperchen einzelne längere und kürzere Ketten dieser Coccen auf das Ueberzeugendste und Deutlichste.

Es wurden ferner die endocarditischen Wucherungen einer genauen microscopischen Untersuchung unterworfen, — allein an keiner Stelle, weder an der Oberfläche noch in der Tiefe konnten Micrococcen nachgewiesen werden; dagegen gelang es in den Capillaren der Glomeruli, sowie auch in den anderen Gefäßen der Niere, fast in jedem Schnitte dicht gedrängte Micrococcen zu tingiren; es war aber bei der dichten Lagerung nicht möglich, über die Größe und Gruppierung der Coccen etwas Genaueres festzustellen.

Faßt man nun den microscopischen Befund kurz zusammen, so handelt es sich hier um eine den ganzen rechten Unterlappen einnehmende catarrhalische Pneumonie mit fibrinös-feröser Pleuritis und ausgedehnter Dilatation der Lymphgefäße der Pleura und Lunge, Kettencoccen in

großer Zahl in den dilatirten Lymphgefäßen, im pleuritischen Exsudat, in den Blutgefäßen der Lunge und der Nieren, während dieselben durchaus fehlen im Alveolar-exsudat und in den endocarditischen Wucherungen.

Bei der großen Aehnlichkeit der hier gefundenen Coccen mit denen des Erysipels ist gewiß die Frage berechtigt: dürfen wir die betreffenden Micrococcen mit denen des Erysipels identificiren und damit die Lungenaffection als eine erysipelatöse bezeichnen?

Kettencoccen oder nach *Billroth's* Nomenclatur Streptococcen kennen wir verschiedene Arten. Sehen wir von der einen ab, die *Koch* als Ursache einer progressiven Gewebnecrose an Mäusen gefunden hat, so kommen hier vor allen Dingen der Streptococcus des Erysipels [*Fehleisen*¹⁾ und *Koch*²⁾], und der Streptococcus pyogenes, welch letzteren *Rosenbach*³⁾ in geschlossenen Eiterungen beobachtete, in Betracht; ferner der kettenbildende Micrococcus, den *Löffler*⁴⁾ bei der Diphtherie constatirte.

Da es sich offenbar in unserm Fall nur um den Streptococcus erysipelatosus oder um den Streptococcus pyogenes handeln kann, und schon durch *Rosenbach* hervorgehoben worden ist, daß, abgesehen von dem höchst charakteristischen culturellen Wachsthum der beiden Micrococcen, wodurch sich dieselben allein unterscheiden lassen sollen, ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal microscopisch sich nicht auffinden läßt, so hätte demnach der einzige positive Beweis, daß es sich hier wirklich um eine echte erysipelatöse Affection der Lunge gehandelt, und daß der in den Lymphgefäßen der Lunge gefundene Coccus wirklich der Strepto-

¹⁾ *Fehleisen*, Aetiologie des Erysipels. Berlin 1883. — Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XVI pag. 391. 1882.

²⁾ *Koch*, Mittheilungen aus dem kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. I pag. 38.

³⁾ *Rosenbach*, Mikroorganismen bei Wundinfectionskrankheiten des Menschen. Wiesbaden 1884.

⁴⁾ *Löffler*, Mittheilungen aus dem kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. II.

coccus erysipelatosus sei, eben nur durch eine Cultur desselben und Uebertragung auf Thiere erbracht werden können. Leider machten jedoch besondere Umstände, wie schon oben erwähnt, dies unmöglich, was um so bedauerlicher ist, als in unserem Fall eine Reincultur wohl sofort hätte erzielt werden können, da die Coccen sich vollkommen unvermischt mit anderen in den dilatirten Lymphgefäßen vorfanden.

Obgleich also der positivste der Beweise, — die Reincultur der gefundenen Microorganismen — nicht erbracht werden kann, so wird man dennoch berechtigt sein, den gefundenen Streptococcus als den des Erysipels und die Lungenaffection als eine echte erysipelatöse Pneumonie zu bezeichnen.

Wir sehen nämlich nach einem Gesichtserysipel ganz plötzlich eine mit einem Schüttelfrost einsetzende Infiltration der Lunge entstehen, die in kaum 24 Stunden zum Tode führt. Und da, wie schon Eingangs hervorgehoben wurde, in der Literatur sich hinreichend verbürgte Thatfachen vorfinden, die darauf hinweisen, daß Erysipel und Pneumonie häufig in bestimmter Weise von einander abhängen, so dürfte aus dieser zeitlichen Aufeinanderfolge schon mit einiger Wahrscheinlichkeit wenigstens auf eine Abhängigkeit der Pneumonie vom Erysipel geschlossen werden.

Ferner ist bemerkenswerth das schnelle Fortschreiten der Infiltration über den ganzen Lappen und auf die Pleura, ein Verhalten, welches wir bei der einfachen catarrhalischen Pneumonie doch nicht beobachten. Es ist also der Verlauf hier ein bösartigerer als gewöhnlich und deutet auf einen infectiösen Ursprung.

Der infectiöse Charakter der Pneumonie ergibt sich aus dem Befund des Streptococcus. Daß derselbe nicht etwa post mortem sich in der Lunge entwickelt hat, sondern vielmehr die Ursache der entzündlichen Veränderung ist, wird dadurch bewiesen, daß derselbe sich ausschließlich in den erkrankten Lymphgefäßen vorfindet.

Und gerade auf letzteren Befund ist das größte Gewicht zu legen. Es scheint nämlich dadurch, daß ein Streptococcus sich ausschließlich in den Lymphgefäßen der Lunge fortentwickelt, in dem Alveolarraum der Umgebung nur eine entzündliche Wucherung veranlaßt, selbst aber die Lymphbahnen nicht verläßt — ein handgreiflicher Beweis gegeben zu sein, daß der gefundene Streptococcus mit dem des Erysipels identisch ist und daß wir es hier mit einer echten erysipelatösen Pneumonie zu thun haben.

Es fragt sich nun, auf welche Weise ist denn der Streptococcus erysipelatosus in die Lungenlymphgefäße gelangt? A priori ist es am wahrscheinlichsten, daß der Micrococcus von einem cutanen Erysipel durch Uebergreifen auf Pharynx, Larynx, Trachea und Bronchien per contiguitatem in die Lunge gelangt, hier in den Lymphgefäßen fortwuchert und eine Entzündung veranlaßt, für welche Annahme eine ganze Anzahl von Beispielen in der Literatur vorliegen, wie ich das Eingangs mitgetheilt habe. In unfrem Fall scheint diese Verbreitungsweise jedoch nicht stattgefunden zu haben, da die betreffenden Organe normal waren, und zwar sowohl Pharynx, wie Larynx und Trachea.

Ein anderer Weg, auf dem der Streptococcus in die Lunge gelangt sein könnte, wäre das Blut. Zwar leugnen *Fehleisen* und *Koch* das Vorkommen der Erysipelcoccen im Blut und für die meisten Fälle von Erysipel mag dies auch richtig sein, allein es ist doch nicht ganz von der Hand zu weisen, daß unter Umständen dieselben auch einmal in das Blut gelangen. Es haben denn auch *Lukomsky*, *Billroth* und *Ehrlich*, ferner *Tillmanns* die Microorganismen bei Erysipel im Blut beobachtet, auch im vorliegenden Fall finden sich die Streptococcen in den Blutgefäßen der Lunge. Daher wird wohl angenommen werden dürfen, daß derselbe an irgend einer Stelle des Gesichtes in das Blutgefäßsystem gelangte, dann auf dem Blutwege in die Lunge gekommen ist und sich hier in den Lymphgefäßen der Lunge und

der Pleura angesiedelt hat. Durch dieses Eindringen in die Blutbahn lag natürlich auch für andere Organe die Gefahr nahe, von Micrococcen überfluthet zu werden, und so findet sich denn auch der Streptococcus in den Capillaren der Nieren und würde, falls noch andere Organe zu untersuchen Gelegenheit gewesen wäre, sich wahrscheinlich auch hier haben constatiren lassen.

Drittens wäre es denkbar, daß Patient aus derselben äußeren Quelle zweimal kurz hintereinander von Micrococcen inficirt worden ist, indem nämlich bei dem Gesichtserysipel die Coccen durch irgend eine kleine Schrunde in die Haut, und bei einer anderen Gelegenheit, die vielleicht erst mit oder nach dem Abblaffen des Hauterysipels gegeben war, die nämlichen Coccen durch den inspiratorischen Luftstrom in die Lunge gelangten und erst von da in das Blutgefäßsystem. Für das Vorkommen primärer, erysipelatöser Pneumonien sprechen besonders die von *Friedreich* gemachten Beobachtungen. Diese Möglichkeit ist nicht zu leugnen, obgleich für vorliegenden Fall die Verbreitung auf dem Blutwege wahrscheinlicher ist.

Ob sich endlich von einem Lungenerysipel aus ein cutanes Erysipel entwickeln kann, wofür einige Beobachtungen zu sprechen scheinen, soll hier nicht weiter ausgeführt werden.

Für alle diese verschiedenen Möglichkeiten liegen Befunde von Microparasiten nicht vor. Es muß aber zum Beweise solcher Annahmen mindestens der Nachweis des Streptococcus erysipelatosus — wie dies in vorliegendem Fall geschehen ist — gefordert werden und wenn möglich sogar — so lange wir wenigstens histologische Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten der Streptococcen nicht kennen — die jedesmalige Reincultur.

Letztere Bedingung zu erfüllen, ist zwar aus oben angegebenen Gründen nicht gelungen, aber auch so wird es erlaubt sein, die in vorliegendem Falle gefundenen Streptococcen mit dem Streptococcus des Erysipels zu identificiren

und ist damit der Beweis geliefert worden, daß es echte erysipelatöse Pneumonien giebt.

Zum Schlusse fühle ich mich verpflichtet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor *Bostroem* für die gütige Ueberlassung des Falles, sowie im reichsten Maße mir zu Theil gewordene freundliche Hülfe meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

